Rezepturen

Artikelnummer 08165316 | Inhalts 10 ml | Grundpreis: 390,00 € / 100 ml | apothekenpflichtig
Darreichungsform: Intuinionskonzentet zur is. Anwendung nach Verdünnung in ausschließlich 100 ml NaCl 0,9%
Bestandteille: Ceucinn 50 mg. hydroxypropyl-best-2cyclodestrin qs. p. 165-60 do s. 4. Masser.

Hinweis: vor Licht geschützt 15 – 25°C | Haltbarkeit: 6 Monate

Curcumin 250

Artikalnummer: 08165488 | Inhalt: 50 ml | Grundpreis: 298,00 e / 100 ml | apothekenpflichtig

Artikalnummer: 08165488 | Inhalt: 50 ml | Grundpreis: 298,00 e / 100 ml | apothekenpflichtig

Darrichungdreim: Infasion-indozentratz zur iz. Anwendung nach Verdürmung in ausschließlich 500 ml NaCl 0,9%

Bestandteile: Curcum 220 mg, hydroxyporyb-bat c/sclodestrin q., PEG 400 q.s., Wasser

Himmeis: vor Liebe specificht 15-25 v.C. | Altibarkeite (Monat)

Altibarkeite Vorland v.G. | Altibarkeite (Monat)

Curcumin-HSA 300

Curcummen 20 Month | Inhalt: 150 ml | Grundpreis: 199,33 € / 100 ml | verschreibungspflichtig |
Darrickhungsform: Inducendoncentet aur ür. Anwendung nach Verdünnung ausschließlich in bellegender Trägerförung Bestandteiler Curumin 300 mg. Hydroxynops/bets Eyrbodentrina, PEG 400 qs., HSA Lösung |
Himweis: vor Licht geschützt 2 - 8°C | Haltbarkeit 6 Month

Curcumin/Resveratrol 100/50

Artikelnummen: 08/65544 | Inhaltt 20 mt | Grundpriets: 549,50 € / 100 mt | apothekenpflichtig

Darreichungdform: Infusionskonzentrat zur ix. Anwendung nach Verdünnung ausschließlich in 500ml NaCl 0,9%

Bestandteile: Curcumin 100 mg. Resveratrol 50 mg. Hydrosypropyl-bette-Cyclobotrin qa., 76G 400 qa., Wasser

Curcumin Zäpfchen 500 mg Artikelnummer: 08165517 | Inhalt: 1 Stk. | Grundpreis: 20,00 € / 1 Stk. | apothekenpflichtig

Hinweis: vor Licht geschützt 2 − 8°C | Haltbarkeit: 6 Monate

25.00 €*

Curcumin/DMSO Zäpfchen 500 mg
Artikelnummer: 08165502) [Inhalt: 1 Sik.] Grundpreis: 25,00 € / 1 Sik.] verschreibungspflichtig
Darreichungsform: Suppositorien zur rektalen Anwendung
Bestandteile: Curcumin 300 mg, DMSO 14%, Hillistoffe qs.

Hinweis: vor Licht geschützt 2 − 8°C | Haltbarkeit: 6 Monate

Curcumin Pulver

39,90 €* /99,90 €*

Artikelnummer: 08165338/99 | Inhalt: 30 g / 3x 30 g | Grundpreis: 133.00 bzw. 111.00 € / 100 g | apothekenpflichtig

Darnichungsform: Pulver zur Einnahme nach Verdünnung mit Wasser

Bestandteiler Curcumin 30 g

Hinweis: vor Licht geschützt 15 – 25°C | Haltbarkeit: 6 Monate

Quellen

- Language Control and Control

Bestellmöglichkeiten

Viktoria Apotheke Saarbrücken | VERSAND | Bahnhofstr. 95-97 | 66111 Saarbrücken | Online-Bestellung www.intermet-spotheke.de - Le Mail-Bestellung: bestellung-giinternet-spotheke.de - Faar-Bestellung: 49 (0) 681 - 91 00 55 029

CURCUMIN



Viktoria Apotheke

www.internet-anotheke.de

Curcumin

Currumin ist ein lipophiles Polyphereol aus der Gelbeurzel
Gurcum Gross, der ihr die typische, tiefgelbe Falbe
Gerbard Gross, der ihr die typische, tiefgelbe Falbe
Kreibstenzige und bei inflammatorischen Prozessen ist
Kreibstenzige und bei inflammatorischen Prozessen ist
Kreibstenzige kunn der ließunde von der Gerbardungsfelber Ammen der Belagen bei bei dusch-apvendichte (Zingbezoeut) und ist in Südort-Alies
kann der Begrenzber bei Bunde wegens nehme zur der stehen der Berginsche geste bei induch-apvendichten und erzüschinghehmenneden
Gigenschaften geschätzt und eriegensten Habitstoffe, sog. "Gurcuminode" im Kufauns-Wurzefestratst
stoffe, sog. "Gurcuminode" im Kufauns-Wurzefestratst
Gurcumin Glifertufylinerham (I)—Beild-Pydroxyl-methon)
Die beite Süscherdersteg zeigt der inolerte Wirkstoff
Gurcumin Glifertufylinerham (I)—Beild-Pydroxyl-methon)
Germel-Pydroph-to-Gene-3-5-doroni.

Curcumi (Direticiyinethan (Divalet-piranyi-methan) (Divalet-piranyi-methan) (Divalet-piranyi-methan) (Divalet-piranyi-methan) (Divalet-piranyi-methan) (Curcumi asi sush ference dipranti methani der Wurzelenthanyi curcumi asi sush ference dipranti methani (MOK) undi Bisiderhoquirumi (BOMC) per Ateid des reinen Curcumi in Gesamtwurzelet task let şall-affeniga neb is verigein Prazies.

Einsatzgebiete

Wirkungsweise

Curcumin zielt als epigenetischer Regulator auf eine Vielzahl molekularer Ziele und Signalwege ab. Es übt Einfluss auf Transkriptionsfaktoren, Entzündungsmediatoren, Protein-kinasen und Enzyme aus.

- immunstimulierend - anti-diabetisch - anti-arthritisch - anti-depressiv - anti-arteriosklerotisch - schmerzlindernd

strahlen- und chemoprotektiv



Curcumin als synergistische und sensitivierende Therapiekomponente

POLYPHENOL	CHEMOTHERAPIE	KREBSART	QUELLE
Curcumin	Cisplatin	Lunge	[32]
Curcumin	Cisplatin	Kopf-Hals	[33]
Curcumin	Valproinsäure	Leukämie	[34]
Curcumin	Gemcitabin	Pankreas	[35]
Curcumin	5-Fluorouracil	Brust	[36]
Curcumin	5-Fluorouracil	Magen	[37]
Curcumin	5-Fluorouracil + Oxaliplatin	Kolon	[38]
Curcumin	Bevacizumab	Leber	[39]
Curcumin	Imatinib	Leukämie	[40]
Curcumin	Paclitaxel	Hirn	[41]
Curcumin	Oxaliplatin	Kolon	[42]
Curcumin	Temozolomid	Glioblastom	[43]
Curcumin	Gefitinib	Lunge	[44]
(Abb. modificient rach (45)			

Auch ein sensitivierender Effekt bei der Kombination mit Curcumin und einer Strahlentherapie konnte in Prostata PC-3 Krebszellen gezeigt werden [46].

Curcumin in der Krebstherapie

Currumin var in einer Velateld klinischer Studien in Aber such extinsische Apoptosewap, abs die Bindung der Lage, anti-tumcale Effekte wie Apoptose und von apoptorischen Liganden an hen Enzeptoren, weir om Polletfestinnshemung in Melstonen, Gildbistone, Dereit der Studien der Studien der Studien zu deutscher 19.18. d. b. seiner 19.18. d. seiner 19.18. d. b. seiner 19.18. d. s

seletive fordstore de Apoptose in Turorelle n. Carumin et ces seletive foldstore de Apoptose in Turorellen Carumin et me sericità diese zum einen durch die Hochregulation der verbilden diese zum einen durch die Hochregulation der verbilden diese zum anderen durch die Initiation des sp5-Expression, zum anderen durch die Initiation des mitochondrisien (intimischen Apoptoseweyes 124, 25).

Vorteile unserer Rezepturen durch Cyclodextrin

Schnelle repale Clearance verbleiht nach parenteraler Gabe extrazellulär

Minimales Risiko eines anaphylaktischen Schocks

Von Therapeuten bestätigte Sicherheit und Verträglichkeit

Keine vorherige Handhabe von Cortison oder eines speziellen Infusionsbestecks erforderlich

Nierenschäden - bekannten Umverträglichkeiten gegen e
 bei Patienten unter 2 Jahren - CAVE: Curcumin wirkt gallentreibend

(nach bisherigen therapeutischen Erfahrungen, Indikationsstellung und weiterer Therapie): 1-2x/Woche bei 10 Arwendungen/Behandlungszyklus, nach Bedarf wiederholen